

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	コララン錠2.5mg、5mg (小野)	イバブラジン	洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全	1回2.5mgを1日2回食後経口投与から開始。必要に応じ、2週間以上の間隔で段階的に用量を増減。	2.5mg1錠 ¥82.90 5mg1錠 ¥145.40	院内 院外	内藤 (内科)
2	リクシアナOD錠15mg	エドキサバン トシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤	1日1回経口投与する。 体重60kg以下:30mg 体重60kg超:60mg	15mg1錠 ¥224.7	院内 院外	内藤 (内科)
3	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	選択的SGLT2阻害剤 1・2型糖尿病 慢性心不全	糖尿病:5mgを1日1回経口投与する。 慢性心不全:10mgを1日1回経口投与する。	10mg1錠 ¥290.50	院内 院外	内藤 (内科)
4	メラトベル顆粒小児用0.2% (ノーベル)	メラトニン	小児期の神経発達症に伴う 入眠困難の改善	1日1回1mgを就寝前に経口投与。	0.2%1g ¥207.80	院外	深澤 (小児)
5	ノバルジン錠25mg (ノーベル)	酢酸亜鉛水和物	1.ウィルソン病(肝レンズ核変性症) 2.低亜鉛血症	1.成人には、1回50mgを1日3回経口投与。6歳以上の小児には、1回25mgを1日3回経口投与。1歳以上6歳未満の小児には、1回25mgを1日2回経口投与。いずれの場合も、食前1時間以上又は食後2時間以上あけて投与すること。 2.1回25~50mgを開始用量とし1日2回経口投与。体重30kg未満の小児では、1回25mgを1日1回経口投与。いずれの場合も、食後に投与すること。	25mg1錠 ¥274.40	院外	深澤 (小児)
6	動注用アイエーコール 100mg(バクスター)	シスプラチン	肝細胞癌	シスプラチン100mgあたり70mLの生理食塩液を加えて溶解し65mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を肝動脈内に挿入されたカテーテルから、1日1回肝動脈内に20~40分間で投与し、4~6週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。	100mg1瓶 ¥64,863	院内 (用時)	藤田 (内科)
7	ケフレックスカプセル 250mg(共和薬品)	セファレキシン	セフェム系抗生物質	1回250mgを6時間ごとに経口投与。	250mg1CP ¥31.50	院内 院外	中村 (麻酔)
8	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	原発性腋窩多汗症	1日1回、適量を腋窩に塗布。	5%1g ¥243.70	院外	飯田 (皮膚)
9	アスペノンカプセル10	アプリンジン 塩酸塩	頻脈性不整脈	1日40mgより投与をはじめ、効果が不十分な場合は60mgまで増量し、1日2~3回に分けて経口投与する。	10mg1CP ¥37.70	院内 院外	永尾 (脳外)
10	エネフリード輸液550mL、 1100mL	アミノ酸・糖・ 電解質・脂肪・ ビタミン	アミノ酸、電解質、カロリー、 脂肪酸、水溶性ビタミン及び水分の補給	1回550mLを末梢静脈内に点滴静注する。投与速度は、通常、成人550mL当たり120分を基準とする。最大投与量は1日2200mLまでとする。	550mL1キット ¥1,059 1100mL1キット ¥1,473	院内	小泉 (外科)
11	ジセラカ錠100mg、200mg	フィルゴチニ ブマレイン酸塩	既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)	200mgを1日1回経口投与。患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。	100mg1錠 ¥2,550.90 200mg1錠 ¥4,972.80	院内 院外	大橋 (内科)
12	リンヴォック錠7.5mg、 15mg	アツヴィ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)	15mgを1日1回経口投与する。患者の状態に応じて7.5mgを1日1回投与することができる。	7.5mg1錠 ¥2,550.90 15mg1錠 ¥4,972.80	院内 院外	大橋 (内科)
13	アニュイティ100µgエリプ タ30吸入用(GSK)	フルチカゾン フランカルボン酸エステル	気管支喘息	100µg1吸入を1日1回吸入投与。	30吸入1キット ¥1,816.50	白羽 専用	吉野 (白羽)
14	レボノルゲストレル錠1.5mg 「F」 (富士製薬工業)	レボノルゲス トレル	緊急避妊	性交後72時間以内に1.5mgを1回経口投与。		白羽 専用	吉野 (白羽)
15	レグテクト錠333mg	アカンプロ サートカルシウム	アルコール依存症患者における断酒維持の補助	1回666mgを1日3回食後に経口投与する。	333mg1錠 ¥47.90	白羽 専用	吉野 (白羽)
16	ベオーバ錠50mg (杏林=キッセイ)	ビベグロン	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	50mgを1日1回食後に経口投与。	50mg1錠 ¥184.10	院外	渡邊 (泌尿)
17	イオメロン300注20mL、 50mL	イオメプロー ル	非イオン性造影剤	添付文書参照	20mL1瓶 ¥1,667 50mL1瓶 ¥3,190	院内	鈴木 (画像)

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	アルスロマチック関節手術用灌流液(バクスター)	乳酸リンゲル液	関節鏡視下検査・手術時または関節切開による手術時の関節腔の拡張および灌流・洗浄	使用量は目的に応じて3~12Lとする。	1袋 ¥1,202.00	院内	今田 (整形)
2	デエピゴ錠2.5mg、5mg(エーザイ)	レンボレキサント	不眠症	1日1回5mgを就寝直前に経口投与。症状により適宜増減するが、1日1回10mgを超えない。	2.5mg1錠 ¥57.30 5mg1錠 ¥90.80	院内 院外	鈴木 (整形)
3	コレクチム軟膏0.5%(日本たばこ=鳥居)	デルゴシチニブ	アトピー性皮膚炎	1日2回、適量を患部に塗布。1回あたりの塗布量は5gまでとする。	0.5%1g ¥139.70	院外	飯田 (皮膚)
4	ミネプロ錠2.5mg(第一三共)	エサキセレン	高血圧症	1回2.5mgを1日1回経口投与。効果不十分な場合は、5mgまで増量することができる。	2.5mg1錠 ¥91.6	院内 (用時) 院外	内藤 (内科)
5	タブコム配合点眼液(参天)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼。	1mL ¥947.10	院外	鈴木 (眼科)
6	ビムパット錠50mg 100mg(UCB=第一三共)	ラコサミド	てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)	1日100mgより投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて増量し、維持用量を1日200mgとするが、いずれも1日2回に分けて経口投与。	50mg 1錠 ¥218.40 100mg 1錠 ¥356.40	白羽 専用	吉野 (白羽)
7	ビムパットドライシロップ10%(UCB=第一三共)	ラコサミド	てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)	4歳以上の小児には1日2mg/kgより投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kgずつ増量し、維持用量を体重30kg未満の小児には1日6mg/kg、体重30kg以上50kg未満の小児には1日4mg/kgとする。1日2回に分けて経口投与。	1g ¥392.10	白羽 専用	吉野 (白羽)
8	イオメロン300注シリンジ100mL(エーザイ)	イオメプロール	コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影、脳血管撮影、胸部血管撮影、腹部血管撮影、四肢血管撮影、デジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、デジタルX線撮影法による動脈性血管撮影	撮影の種類により用量が設定されている。添付文書参照。複数回投与する場合は、総使用量は250mLまでとする。	1筒 ¥6,733	院内	鈴木 (画像)
9	チラーチンS静注液200μg(あすか製薬)	レボチロキシンナトリウム水和物	粘液水腫性昏睡 甲状腺機能低下症(ただし、レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限る)	粘液水腫性昏睡: 1日目は50~400μgを緩徐に静脈内投与し、2日目以降は50~100μgを1日1回、緩徐に静脈内投与。 甲状腺機能低下症: 25μgから投与を開始し、50~150μgを維持用量として、1日1回、緩徐に静脈内投与。	1管 ¥20,211	院内 (用時)	松下 (薬剤)
10	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(セオリア=武田)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	耳垢の除去	綿棒等で外耳へ塗布して使用する。除去困難な場合は数滴点耳後5分~20分後に微温湯(37℃)にて洗浄を行う。	5%1mL ¥51.00	院内 院外	松下 (薬剤)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アテノロール錠25mg「サワイ」	心臓選択性β遮断剤	
2	内用	オキシコドン徐放錠10、20、30mg「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	販売中止
3	内用	ジスロマックSR成人用ドライシロップ	マクロライド系抗生物質	製造中止
4	内用	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	Ca拮抗剤	
5	内用	調剤用パンピタン末	総合ビタミン剤	
6	内用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
7	内用	プラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」	ロイコトリエン受容体拮抗剤	
8	内用	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗剤	
9	内用	ペルサンチン-Lカプセル150mg	徐放性抗血小板剤	製造中止
10	内用	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	食後過血糖改善剤	
11	内用	ボノテオ錠1mg	骨粗鬆症治療剤	
12	内用	ワイパックス錠1.0	マイナートランキライザー	
13	外用	アドエア125エアゾール120吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
14	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	抗リウマチ薬	
15	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」	抗リウマチ薬	
16	注射	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	抗リウマチ薬	
17	注射	献血ヴェノグロブリンH5%静注5g/100mL	人免疫グロブリン製剤	
18	注射	マイクロファインプラス	インスリン用針	

切替えによる削除薬剤（別紙(4)(5)薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
1	内用	エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」
2	内用	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」
3	内用	セレスターナ配合錠
4	内用	ミソリピン錠50mg「ファイザー」
5	内用	リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」
6	内用	リリカOD錠25mg
7	内用	リリカOD錠75mg
8	注射	オムニパーク350注シリンジ100mL
9	注射	オムニパーク300注シリンジ125mL
10	注射	オムニパーク300注シリンジ150mL
11	注射	注射用ソル・メルコート1,000
12	注射	パーサビブ静注透析用2.5mg
13	注射	パーサビブ静注透析用5mg
14	注射	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
15	注射	ホスミンSバッグ2g点滴静注用

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。  
※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価3	薬効
1	ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL	アッヴィ= エーザイ	¥62,620.0	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL 「FKB」	FKB=マイ ランEPD	¥39,849.0	ヒト型抗ヒ トTNF $\alpha$ モ ノクローナ ル抗体製剤
2	リリカOD錠25mg	ファイ ザー	¥65.2	プレガバリンOD錠25mg	ファイザー UPJ=ファ イザー	¥21.8	神経障害性 疼痛・線維 筋痛症
3	リリカOD錠75mg	ファイ ザー	¥108.8	プレガバリンOD錠75mg	ファイザー UPJ=ファ イザー	¥36.3	神経障害性 疼痛・線維 筋痛症

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。  
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

.切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」	⇒	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	販売中止
2)	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	⇒	セフジニルカプセル100mg「トーワ」	販売中止(院外のみ)
3)	オムニパーク350注シリンジ100mL	⇒	オブチレイ320注シリンジ100mL	画像希望
4)	オムニパーク300注シリンジ125mL	⇒	オブチレイ350注シリンジ100mL	画像希望
5)	オムニパーク300注シリンジ150mL	⇒	オブチレイ350注シリンジ135mL	画像希望
6)	セレスターナ配合錠	⇒	ベタセレミン配合錠	供給遅延
7)	注射用ソル・メルコート1,000	⇒	ソル・メドロール静注用1000mg	販売中止
8)	パーサビブ静注透析用2.5mg	⇒	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	シリンジへ
9)	パーサビブ静注透析用5mg	⇒	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	シリンジへ
10)	ホスミシンSバッグ2g点滴静注用	⇒	ホスミシンS静注用2g	販売中止
11)	ミゾリピン錠50mg「ファイザー」	⇒	ミゾリピン錠50mg「サワイ」	販売中止
12)	リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」	⇒	リスペリドン内用液分包1mg「日医工」	販売中止