

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ベージニオ錠 50mg・100mg・150mg (日本イライリ)	アベマシクリブ	ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	内分泌療法剤との併用において、通常、成人にはアベマシクリブとして1回150mgを1日2回経口投与する。ただし、術後薬物療法の場合には、投与期間は24ヵ月間までとする。なお、患者の状態により適宜減量する。	50mg ¥3319 100mg ¥6059.4 150mg ¥8616.8	院内 院外	大石康 (外科)
2	ブコラム口腔用液 2.5mg・5mg・7.5mg (武田薬品)	ミダゾラム	てんかん重積状態	通常、修正在胎52週(在胎週数+出生後週数)以上1歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回2.5mg、1歳以上5歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回5mg、5歳以上10歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回7.5mg、10歳以上18歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回10mgを頬粘膜投与する。	2.5mg0.5mL1筒 ¥1,125.80 5mg1mL1筒 ¥1,977.80 7.5mg1.5mL1筒 ¥2,750.00	院内	深澤 (小児科)
3	モイゼスト軟膏 0.3%・1% (大塚製薬)	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎	通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。	0.3%1g ¥142.00 1%1g ¥152.10	院外	深澤 (小児科)
4	マンジャロ皮下注 2.5mg・5mgアテオス (田辺三菱製薬)	チルゼパチド	2型糖尿病	通常、成人には、チルゼパチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。	2.5mg0.5mL1kit ¥1,924 5mg0.5mL1kit ¥3,848	院内 院外	内藤 (内科)
5	スキリージ皮下注 150mgシリンジ1mL (アッヴィ)	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、掌蹠膿疱症	<尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症> 通常、成人にはリサンキズマブ(遺伝子組換え)として、1回150mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態に応じて1回75mgを投与することができる。 <掌蹠膿疱症> 通常、成人にはリサンキズマブ(遺伝子組換え)として、1回150mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与する。	150mg1mL1筒 ¥474,616	院内	近藤 (内科)
6	ダブロック錠 2mg・4mg (協和キリン)	ダプロデュスタット	腎性貧血	通常、成人にはダプロデュスタットとして1回2mg又は4mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回24mgまでとする。	2mg ¥172.2 4mg ¥303.6	院内 院外	大橋 (内科)
7	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (大塚製薬)	オゾラリズマブ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	通常、成人にはオゾラリズマブ(遺伝子組換え)として1回30mgを4週間の間隔で皮下投与する。	30mg0.375mL1筒 ¥112,476	院内 院外	大橋 (内科)
8	エクフィナ錠 50mg (エーザイ)	サフィナミドメシル酸塩	レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing off現象の改善	本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。通常、成人にはサフィナミドとして50mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じて100mgを1日1回経口投与できる。	50mg ¥886.7	院外	門脇 (脳外科)

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ツートラム錠50mg (日本臓器)	トラマドール	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛 慢性疼痛 疼痛を伴う各種がん	通常、成人にはトラマドール塩酸塩として1日100~300mgを2回に分けて経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する。ただし1回200mg、1日400mgを超えないこととする。	50mg 1錠 ¥55.30	院内 院外	鈴木 (整形外科)
2	グラアルファ配合点眼液 (興和)	リパスシル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合 緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日2回点眼する。	5mL 1瓶¥2,575	院外	松岡 (眼科)
3	アレジオンLX点眼液 0.1%	エピナスチン塩酸塩液	アレルギー性結膜炎	通常、1回1滴、1日2回 (朝、夕) 点眼する。	5mL 1瓶¥2,606.5	院外	古森 (眼科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	エバルレスタット錠50mg「日医工」(院外専用)	糖尿病用薬(アルド-還元酵素阻害薬)	販売中止、 「VTRS」採用あり
2	内用	トラマール錠OD錠25mg	麻薬拮抗性鎮痛薬	ツトラム錠採用あり
3	内用	トランコロンP錠	過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)	販売中止
4	内用	ブシラミン錠100mg	抗リウマチ薬	販売中止
5	内用	ペリシッド錠250mg(院外専用)	高脂血症用薬	販売中止
6	内用	マーロックス懸濁配合顆粒	消化性潰瘍用薬	販売中止
7	内用	硫酸マグネシウム「NIKP」	下剤-内用(塩類下剤)	販売中止
8	外用	アドエア100・250・500ディス 28吸入用(院外専用)	気管支喘息用薬-吸入	60吸入用あり
9	外用	インタールエアゾール(院外専用)	気管支喘息用薬-吸入	販売中止予定
10	外用	サージセルアブソorbブルヘモスタット	止血薬-外用(その他)	販売中止
11	外用	ニコチネルTTS10・20・30	禁煙補助剤	OTCあり使用減
12	外用	流動パラフィン「ヨッ」	軟膏基剤	販売中止
13	外用	レルベア100エリプタ14吸入(院外専用)	気管支喘息用薬-吸入	30吸入用あり
14	注射	アイオナールNa0.2	催眠鎮静薬-注射(バルビツル酸系)	販売中止
15	注射	水溶性ハイドロコト注射液	副腎皮質ホルモン剤-注射	使用減

切替えによる削除薬剤（薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
1	内用	アジルバ錠20mg
2	内用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「武田テバ」
3	内用	スピロラクトン錠25mg「テバ」
4	内用	デカドロンエリキシル0.01%；院外
5	内用	トリアゾラム錠0.125mg「テバ」；院外
6	内用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」
7	注射	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サントリー」
8	注射	LH-RH注「テバ」
9	注射	TRH注0.5mg「テバ」
10	注射	ヒトCRH静注用100μg「テバ」

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	アジルバ錠20mg	武田薬品工業	¥140.1	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	日本ケミファ	¥37.0	ARB阻害剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「武田テバ」	⇒	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	成分重複品統合
2)	スピロラクトン錠25mg「テバ」	⇒	スピロラクトン錠25mg「日医工」	成分重複品統合
3)	デカドロンエリキシル0.01%；院外	⇒	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」；院外	製造販売中止
4)	トリアゾラム錠0.125mg「テバ」；院外	⇒	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」；院外	成分重複品統合
5)	モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」	⇒	モサプリドクエン酸塩錠5mg「サイ」	製造販売中止
6)	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サイ」	⇒	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	販売名変更
7)	ヒトCRH静注用100 μ g「テバ」	⇒	ヒトCRH静注用100 μ g「ニフ」	販売名変更
8)	LH-RH注「テバ」	⇒	LH-RH注「ニフ」	販売名変更
9)	TRH注0.5mg「テバ」	⇒	TRH注0.5mg「ニフ」	販売名変更

2. その他

- ・ 次回の薬事委員会は、11月 8日 (水) 16時から開催予定