

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg (帝人ファーマ)	アバロパラチド	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	通常、成人には1日1回アバロパラチドとして80 $\mu$ gを皮下に注射する。 なお、本剤の投与は18カ月間までとすること。	1.5mg/0.75ml ¥16,090	院内 院外	鈴木 (整形外科)
2	フィコンパ点滴静注用2mg (I-ザイ)	ペランパネル	一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対する経口製剤の代替療法 ○てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法	○ペランパネルの経口投与から本剤に切り替える場合 ペランパネル経口投与と同じ1日用量を、1日1回30分以上かけて点滴静脈内投与する。ただし、4歳以上12歳未満の小児への投与時間は90分とする。 ○ペランパネルの経口投与に先立ち本剤を投与する場合 通常、成人及び4歳以上の小児にはペランパネルとして1日1回2mgの投与より開始し、その後2週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増し、維持用量は1日1回4～8mgとし、30分以上かけて点滴静脈内投与する。ただし、4歳以上12歳未満の小児への投与時間は90分とする。	2mg/1瓶 ¥1,962	院内 (用時購入)	山崎 (脳外科)
3	テゼスパイア皮下注210mgペン (アストラゼネカ)	テゼベルマブ	気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る）	通常、成人及び12歳以上の小児にはテゼベルマブ（遺伝子組換え）として1回210mgを4週間隔で皮下に注射する。	210mg/1キット ¥170,987	院内 院外 (用時購入)	中井 (呼吸器科)

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ダフクリア錠200mg (住友ファーマ)	フィダキソマイ シン (FDX)	感染性腸炎 (偽膜 性大腸炎を含む)	通常、成人にはフィダキソマイシンと して1回200mgを1日2回経口投与す る。	200mg ¥4012.8	院内 (用時 購入)	藤田 (内科)
2	バイフォータス筋注シ リンジ50mg・100mg (アストラゼ 朧)	ニルセビマブ	1.生後初回又は2回目 のRSウイルス感染流行 期の重篤なRSウイルス 感染症のリスクを有す る新生児、乳児及び幼 児における、RSウイル ス感染による下気道疾 患の発症抑制 2.生後初回のRSウイル ス感染流行期の1.以外 のすべての新生児及び 乳児におけるRSウイル ス感染による下気道疾 患の予防	生後初回のRSウイルス感染流行期 には、通常、体重5kg未満の新生児 及び乳児は50mg、体重5kg以上の 新生児及び乳児は100mgを1回、 筋肉内注射する。 生後2回目のRSウイルス感染流行期 には、通常、200mgを1回、筋肉 内注射する。	50mgシリンジ ¥459,147 100mgシリンジ ¥906,302	院内 (用時 購入)	深澤 (小児 科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	クレメジンカプセル200mg(院外専用)	慢性腎不全用剤	製造販売中止、細粒あり
2	内用	シュアポスト錠0.5mg(院外専用)	速効型インスリン分泌促進剤	製造販売中止、後発品あり
3	内用	バイシリンG顆粒40万単位(院外専用)	持続性経口ペニシリン製剤	製造販売中止
4	内用	イトリゾール内用液 1%(院外専用)	経口抗真菌剤・イトラコナゾール	製造販売中止、カプセルあり
5	内用	パキシル錠10mg(院外専用)	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)	製造販売中止、CR12.5mg錠あり
6	内用	メナテトレノンCap15mg「ト-ワ」	粗鬆症治療用ビタミンK2剤	院内使用6か月ゼロ
7	内用	エンシュアリキッド250ml	経腸栄養剤(経口・経管両用)	院内使用量減、イノラス配合経腸液あり
8	注射	チエナム点滴静注用キット0.5g⇒製造販売中止	カルバペネム系抗菌薬	製造販売中止
9	注射	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
10	注射	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
11	注射	ミルセラ注シリンジ75 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
12	注射	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
13	注射	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
14	注射	ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり
15	外用	ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g	持続型赤血球造血刺激因子製剤	使用量減少、他剤あり

切替えによる削除薬剤(薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。)

No.	区分	薬品名
1	内用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
2	内用	ジルチアゼム塩酸塩R加 <sup>®</sup> 100mg「サイ」
3	内用	アミノバクト配合顆粒
4	内用	ヨウ化カリウム「日医工」バラ25g
5	内用	ビタノイリンカプセル25
6	内用	ネオレスタミンコーワ散1%
7	内用	フランドル錠20mg(院外専用)
8	注射	グラニセトロン点滴静注液3mg <sup>ハ<sup>®</sup></sup> ッグ <sup>®</sup> 「明治」

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	イグザレルトOD錠10mg	バイエル	¥342.9	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	第一三共I スア	未定 (12月発売)	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
2	エクア錠50mg (院外専用)	ノバルティス=住友ファーマ	¥60.6	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」(院外専用)	東和	未定 (12月発売)	選択的DPP-4阻害薬
3	ピタノイリンカプセル25	武田テバ	¥5.9	ノイロピタン配合錠	LTL	¥5.8	ビタミンB(1、2、6、12)配合剤
4	ネオレスタミンコーワ散1%	興和	¥7.9	クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「日医工」	日医工	¥7.3	アレルギー性疾患治療剤
5	フランドル錠20mg (院外専用)	トーアエイヨー	¥10.0	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」(院外専用)	東和	¥5.9	虚血性心疾患治療剤
6	バルトレックス錠500mg	GSK	¥170.2	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サントファーマ	¥76.7	抗ウイルス化学療法剤
7	ミカルディス錠20・40mg (院外専用)	バ=リカ=	¥25.3 ¥38.2	テルミサルタン錠20・40mg「サワイ」(院外専用)	沢井	¥10.1 ¥10.1	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
8	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	GSK	¥1,086.8	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	武田テバ	¥1,206.5	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。  
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」	⇒	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	限定出荷あり 切り替え
2)	シルチアゼム塩酸塩Rカ <sup>®</sup> 錠100mg「サイ」(後発品)	⇒	ヘルベッサーRカ <sup>®</sup> 錠100mg(先発品)	限定出荷あり 切り替え
3)	アミノバクト配合顆粒(後発品)	⇒	リーバクト配合顆粒(先発品) 後発販売なし	製造販売中止
4)	ヨウ化カリウム「日医工」バラ25g	⇒	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」バラ25g	製造販売中止
5)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg・100mg「SUN」	⇒	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg・100mg「NK」	限定出荷あり 切り替え
6)	グラニセトロン点滴静注液3mgパ <sup>®</sup> ッグ「明治」	⇒	グラニセトロン点滴静注液3mgパ <sup>®</sup> ッグ「HK」	製造販売中止

## 2. その他

- ワクチン接種後の待ち時間について・・・成人；およそ15分は院内で経過観察が望ましい。(アレルギー既往者を除く)  
・・・小児についてはおよそ30分は院内で経過観察が望ましい
- ロヒバカイン「ルヒ」150mg/20mlが発売となった。アナペイン(先発品)が不足時、臨時購入する
- 次回の薬事委員会は、2月に開催予定