

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	セリンクロ錠10mg （大塚）	ナルメフェン塩 酸塩水和物	アルコール依存症患者にお ける飲酒量の低減	通常、成人にはナルメフェン塩酸塩として1回 10mgを飲酒の1～2時間前に経口投与する。ただ し、1日1回までとする。なお、症状により適宜増 量することができるが、1日量は20mgを超えな いこと。	1錠 ¥301.50	院内	藤田 (内科)
2	ナルサス錠 2mg 6mg 12mg （第一三共）	ヒドロモルフォン 塩酸塩徐放錠	中等度から高度の疼痛を伴 う各種癌における鎮痛	通常、成人にはヒドロモルフォンとして4～ 24mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ て適宜増減する。	2mg 1錠 ¥206.60 6mg 1錠 ¥540.00 12mg 1錠 ¥990.20	院内 院外	藤田 (内科)
3	ナルラピド錠 1mg 2mg 4mg （第一三共）	ヒドロモルフォン 塩酸塩錠	中等度から高度の疼痛を伴 う各種癌における鎮痛	通常、成人にはヒドロモルフォンとして1日4～ 24mgを4～6回に分割経口投与する。なお、症状 に応じて適宜増減する。	1mg 1錠 ¥112.60 2mg 1錠 ¥206.6 4mg 1錠 ¥378.8	院内 院外	藤田 (内科)
4	ヌーカラ皮下注100mgペン （GSK）	ヒト化抗IL-5モ ノクローナル抗 体メボリズマブ （遺伝子組換 え）製剤	気管支喘息（既存治療に よっても喘息症状をコント ロールできない難治の患者 に限る）既存治療で効果不 十分な好酸球性多発血管炎 性肉芽腫症	＜気管支喘息＞通常、成人及び12歳以上の小児に はメボリズマブ（遺伝子組換え）として1回 100mgを4週間ごとに皮下に注射する。＜好酸球 性多発血管炎性肉芽腫症＞通常、成人にはメボリ ズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを4週 間ごとに皮下に注射する。	1キット ¥159,891	院内 院外 (患者 限定)	大橋 (内科)
5	برانلکاستDS10%「サ ワイ」 （沢井）	برانلکاست	気管支喘息、アレルギー性 鼻炎	通常、小児にはبرانلکاست水和物として1日 量7mg/kg（ドライシロップとして70mg/kg） を朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁し て経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増 減する。1日最高用量はبرانلکاست水和物と して10mg/kg（ドライシロップとして 100mg/kg）とする。ただし、برانلکاست水 和物として成人の通常の用量である450mg/日 （ドライシロップとして4.5g/日）を超えないこ と。	1 g ¥26.8	院内	深澤 (小児 科)
6	ミニリンメルトOD錠25 μg （フェリング=キッセイ）	デスモプレシン 酢酸塩水和物	男性における夜間多尿によ る夜間頻尿	成人男性には、通常、1日1回就寝前にデスモプレ シンとして50 μgを経口投与する。	1錠 ¥52	院外	渡邊 (泌尿器 科)
7	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% （ノバルティスファーマ）	ネパフェナク	内眼部手術における術後炎 症	通常、手術前日より、用時よく振り混ぜた後、1回1 滴、1日3回点眼する。但し、手術日は術前3回、術後 1回点眼する。	1 瓶 ¥765	院内 院外	磯貝 (眼科)
8	イオプロミド 300シリンジ100mL 「BYL」 （バイエル）	イオプロミド	脳血管撮影、胸部血管撮影、腹 部血管撮影、四肢血管撮影、 ディジタルX線撮影法による静 脈性血管撮影、ディジタルX線 撮影法による動脈性血管撮影、 コンピューター断層撮影におけ る造影、静脈性尿路撮影	添付文書参照	100mL/1筒 ¥4,134	院内	鈴木 (画像)
9	イオプロミド 370シリンジ100mL 「BYL」 （バイエル）	イオプロミド	血管心臓撮影、胸部血管撮影、 腹部血管撮影、四肢血管撮影、 ディジタルX線撮影法による静 脈性血管撮影、ディジタルX線 撮影法による動脈性血管撮影、 コンピューター断層撮影におけ る造影、静脈性尿路撮影	添付文書参照	100mL/1筒 ¥4,637	院内	鈴木 (画像)

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	コレクチム軟膏0.25% （鳥居）	デルゴシチニブ	アトピー性皮膚炎	通常，成人には，0.5％製剤を1日2回，適量を患部に塗布する。なお，1回あたりの塗布量は5gまでとする。 通常，小児には，0.25％製剤を1日2回，適量を患部に塗布する。症状に応じて，0.5％製剤を1日2回塗布することができる。なお，1回あたりの塗布量は5gまでとするが，体格を考慮すること。	1 g ¥141.40	院外	深澤 (小児科)
2	カボメティクス錠 20mg 60mg （武田）	カボザンチニブリンゴ酸塩	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回60mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。ニボルマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはカボザンチニブとして1日1回40mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	20mg ¥8,007.60 60mg ¥22,333.00	院内 (患者限定)	中村 (外科)
3	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ （ノボノルディスクファーマ）	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	インスリン療法が適応となる2型糖尿病	通常、成人では、初期は1日1回10ドーズ（インスリン デグルデク／リラグルチドとして10単位/0.36mg）を皮下注射する。投与量は患者の状態に応じて適宜増減するが、1日50ドーズ（インスリン デグルデク／リラグルチドとして50単位/1.8mg）を超えないこと。注射時刻は原則として毎日一定とする。なお、本剤の用量単位である1ドーズには、インスリン デグルデク1単位及びリラグルチド0.036mgが含まれる。	1キット ¥5,359	院内 院外	内藤 (内科)
4	テイコプラニン点滴静注用 「明治」 400mg （MeijiSeika）	テイコプラニン 400mg	本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染 敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染	通常、成人にはテイコプラニンとして初日400mg（力価）又は800mg（力価）を2回に分け、以後1日1回200mg（力価）又は400mg（力価）を30分以上かけて点滴静注する。敗血症には、初日800mg（力価）を2回に分け、以後1日1回400mg（力価）を30分以上かけて点滴静注する。	400mg/瓶 ¥2,882	院内	鈴木基 (整形外科)
5	レスリン錠25 （オルガノン）	トラゾドン塩酸塩	うつ病・うつ状態	トラゾドン塩酸塩として、通常、成人には1日75～100mgを初期用量とし、1日200mgまで増量し、1～数回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	25mg ¥12.40	院内 院外	大石 (療養)
6	エクラープラスター 20μg/cm2 （久光）	デプロドンプロピオン酸エステル	湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピタール苔癬を含む）、虫さされ、痒疹群〔蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、結節性痒疹（固定蕁麻疹）を含む〕、乾癬、掌蹠膿疱症、肥厚性瘢痕・ケロイド、扁平紅色苔癬、慢性円板状エリテマトーデス、環状肉芽腫	患部を軽く洗浄し、よく乾燥させた後、本品を膏体面被覆ポリエステルフィルムに付着させたまま適当な大きさに切り取り、ポリエステルフィルムを取り除き、患部に膏体面を当てて貼付する。本品は、貼付後12時間又は24時間毎に貼りかえる。必要な場合、夜間のみ貼付する方法もある。なお、貼りかえるときにも患部の洗浄及び乾燥を行う。	7.5cm×10cm ¥53.80	院内 院外	太田 (形成外科)
7	ピラノアOD錠20mg （MeijiSeika）	ピラスチン20mg	アレルギー性鼻炎・蕁麻疹 皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒	通常、成人にはピラスチンとして1回20mgを1日1回空腹時に経口投与する。	20mg ¥66.80	院内 院外	三澤 (耳鼻科)
8	キングラー透析剤3E （扶桑薬品）	人工透析液(2-10)	慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として、活性型ビタミンD3製剤やカルシウム製剤の投与などによる高カルシウム血症の場合であって、以下の要因を持つものに用いる。 1.重炭酸濃度の高い重炭酸型透析液では、過度のアルカローシスを起こすおそれのある場合。 2.糖濃度の低い透析液では、糖尿病など血糖値管理が困難な患者であって、透析開始時高い血糖値（200mg/dL程度）を示す場合 3.カリウム、マグネシウムの高い透析液では、高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合	通常，粉末溶解装置で溶解し，血液透析を行う場合の灌流液として使用する。 用時，A剤（3,120g）に透析用希釈用水を加えて溶解し，10LとしA液とする。 B剤（炭酸水素ナトリウム735g）に透析用希釈用水を加えて，所定の容量に溶解し，これにA液10L及び透析用希釈用水を加えて350Lとする。 用量は透析時間により異なるが，通常，灌流液として150～300Lを用いる。	2袋1組 ¥1707	院内	尾崎 (臨床工学科)

削除決定薬剤

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
3	注射	トラベルミン注	鎮量剤	
4	内用	フェブリク錠20mg	高尿酸血症治療剤	

切替えによる削除薬剤（別紙(4)（5）薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
3	内用	イーケプラ錠500mg
4	注射	イーケプラ点滴静注500mg
5	内用	イレッサ錠250mg
6	内用	シュアポスト錠0.5mg
7	内用	ポトレンド配合錠

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。
※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価3	薬効
1	イーケブラ錠500mg	UCB	¥150.5	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	東和	¥59.50	抗けいれん剤
2	イーケブラ点滴静注500mg	UCB	¥1,604.0	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeika	¥779.00	抗けいれん剤
3	イレッサ錠250mg	アストラゼネカ	¥3,755.0	ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」	沢井	¥1,707.7	抗悪性腫瘍剤
4	シュアポスト錠0.5mg	住友ファーマ	¥37.5	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	沢井	¥17.6	速効型インスリン分泌促進剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1 .切り替え薬品 （~~院内在庫終了次第切り替え~~、院外は切り替え後も使用可）

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	ポトレンド配合錠	⇒	ウラリット配合錠	販売中止のため
2)	フォサマック錠5mg	⇒	アレンドロン酸錠5mg「ザイ」	販売中止のため（院外のみ）

2 .その他

- ・ イオメロン300注シリンジ75mL（ブ ラッ=I-ザ イ）規格追加
- ・ 院内製剤「ボスミン・リンデロン吸入」追加（クラスⅢ）咽頭浮腫、血管収縮に使用
Rp.ボスミン液0.1％ 2ml
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ 10ml
生理食塩液（細口開栓用） 16ml
全量28ml