

No.	薬品名	成分	会社	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	バクスター	関節鏡視下検査・手術時または関節切開による手術時の関節腔の拡張および灌流・洗浄	通常、使用量は目的に応じて3～12Lとする。	1袋 ¥1,202.00	院内	今田 (整形)
2	デエビゴ錠2.5mg デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	エーザイ	不眠症	1日1回5mgを就寝直前に経口投与する。症状により適宜増減するが、1日1回10mgを超えない。	2.5mg1錠 ¥57.30 5mg1錠 ¥90.80	院内 院外	鈴木 (整形)
3	コレクチム軟膏0.5%	テルゴシチニフ	日本たばこ=鳥居	アトピー性皮膚炎	1日2回、適量を患部に塗布する。なお、1回あたりの塗布量は5gまでとする。	0.5%1g ¥139.7	院外	飯田 (皮膚)
4	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレノン	第一三共	高血圧症	エサキセレノンとして2.5mgを1日1回経口投与する。効果不十分な場合は、5mgまで増量することができる。	2.5mg1錠 ¥91.6	院内 院外	内藤 (内科)
5	キャピリン配合錠	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合	大塚=武田	下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制 ・狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、 心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞） ・冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後	1日1回1錠を経口投与する。	1錠 130.30	院外	内藤 (内科)
6	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液	参天	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼する。	1mL ¥94.7.10	院外	鈴木 (眼科)
7	ビムパット錠50mg 100mg	ラコサミド	UCB=第一三共	てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）	1日100mgより投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて増量し、維持用量を1日200mgとするが、いずれも1日2回に分けて経口投与する。	50mg 1錠 ¥218.40 100mg 1錠 ¥356.40	しろわ 専用	吉野 (白羽)
8	ビムパットドライシロップ10%				4歳以上の小児にはラコサミドとして1日2mg/kgより投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kgずつ増量し、維持用量を体重30kg未満の小児には1日6mg/kg、体重30kg以上50kg未満の小児には1日4mg/kgとする。いずれも1日2回に分けて経口投与する。	1g ¥392.10		
9	イオメロン300注シリンジ100mL	イオメプロール	エーザイ	コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路造影、脳血管造影、胸部血管造影、腹部血管造影、四肢血管造影、デジタルX線撮影法による静脈性血管造影、デジタルX線撮影法による動脈性血管造影	撮影の種類により用量が設定されている。添付文書参照。複数回投与する場合は、総使用量は250mLまでとする。	1筒 ¥6,733	院内	鈴木 (画像)
10	チラーチンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム水和物	あすか製薬	粘液水腫性昏睡 甲状腺機能低下症（ただし、レボチロキシナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限る）	粘液水腫性昏睡：1日目は50～400μgを緩徐に静脈内投与し、2日目は50～100μgを1日1回、緩徐に静脈内投与する。 甲状腺機能低下症：25μgから投与を開始し、50～150μgを維持用量として、1日1回、緩徐に静脈内投与する。	1管 ¥20,211	院内 (用時)	松下 (薬剤)
11	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	セオリア=武田	耳垢の除去	綿棒等で外耳へ塗布して使用する。除去困難な場合は数滴点耳後5分～20分後に微温湯（37℃）にて洗浄を行う。	5%1mL ¥51.00	院内 院外	松下 (薬剤)

No.	薬品名	成分	会社	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	デグ ルデク・リガ ルド 配合剤	ノボ	インスリンが適応となる 2型糖尿病	初期は1日1回10ドーズ	1キット ¥5,359	院外	榛葉
2	デザレックス錠5mg	デ ザレクソン	杏林	アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴う そう痒	1回5mgを1日1回	1錠 ¥62.40	院外	榛葉
3	アネメトロ点滴静注液500mg	メトニダゾール	ファイ ザー	嫌気性菌感染症、感染性腸炎 アメーバ赤痢	1回500mgを1日3回、20分以上 かけて点滴静注	1瓶 ¥1,275	院内 (用時)	藤田
4	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ステラマブ	田辺三 菱	尋常性乾癬、関節症性乾癬 クローン病	12週間隔で90mgを皮下投与	1筒 ¥445,131	院内 (限定)	藤田
5	ケタスカプセル10mg	イブシラスト	杏林	1.気管支喘息 2.脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害に よるめまいの改善	1.1回10mgを1日2回 2.1回10mgを1日3回	1C ¥20.40	院内 院外	永尾
6	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトリンエチ ラトメチルスルホン酸	日本 ベーリ ンガー	非弁膜症性心房細動患者における虚血性 脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制	1回150mgを1日2回	1C ¥138.90	院内 院外	永尾
7	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロ トロン複合体	CSL ベーリ ンガー	ビタミンK拮抗薬投与中の患者における、 急性重篤出血時、又は重大な出血が予想 される緊急を要する手術・処置の施行時 の出血傾向の抑制	PT-INR値と体重により投与量 決定。単回投与	1瓶 ¥35652.00	院内	永尾
8	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	ポピドヨード	Meiji Seika	1.手指・皮膚の消毒 2.手術部位(手術野)の皮膚の諸毒	少量の水を加えて摩擦し、よく 泡立たせた後、 1.流水で洗う 2.滅菌ガーゼで拭うまたは、原 液塗布する	10mL ¥20.50	院内	永尾
9	タリージェ錠5mg 15mg	シカバリン酸 塩錠	第一三 共	末梢性神経障害性疼痛	初期用量1回5mgを1日2回経口 投与し、その後1回用量として 5mgずつ1週間以上の間隔をあ けて漸増し、1回15mgを1日2 回経口投与	5mg 1錠 ¥109.70 15mg 1錠 182.90	院内 院外	大橋
10	テリボン皮下注28.2µgオートイン ジェクター	テリボナト酢酸塩	旭化成 ファーマ	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	1日1回、週に2回皮下注射、投 与は24ヵ月間まで	1キット ¥6,018	院内 (用時) 院外	大橋
11	トルツ皮下注80mgオートインジェク ター	トルツマブ	リリー	既存治療で効果不十分な下記疾患 1.尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾 癬、乾癬性紅皮症 2.強直性脊椎炎	1.初回に160mgを皮下投与 し、2週後から12週後までは1 回80mgを2週間隔で皮下投与 し、以降は1回80mgを4週間隔 で皮下投与する。 2.1回80mgを4週間隔で皮下投 与する。	1キット ¥148,952	院外	大橋
12	アミティーザカプセル12µg	ルビプロスタ	マイラ ン EPD	慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除 く)	1回24µgを1日2回、朝食後及 び夕食後に経口投与する	1C ¥61.00	院内 院外	小泉
13	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールナ トリウム水和物	第一三 共	胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低 用量アスピリン投与時における胃潰瘍又 は十二指腸潰瘍の再発抑制 ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	1回20mgを1日1回経口投与す る 非びらん性胃食道逆流症には1 回10mgを1日1回経口投与する	1包 ¥136.90	院外	小泉
14	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不 活化狂犬病ワクチン	GSK	狂犬病の予防及び発病阻止	1.曝露前免疫 適切な間隔をおいて3回筋肉内 に接種する。 2.曝露後免疫 適切な間隔をおいて4~6回筋肉 内に接種する。	1瓶(溶解液付) ¥12,087	院内	松下
15	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状 疱疹ワクチン	GSK	带状疱疹の予防	標準として1回目の接種から2か 月後に2回目の接種を行う。	1瓶(溶解液付) ¥16,500	院内	松下
16	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテリド・グリ ピロニウム臭化物・ ヒモロールマル酸塩 水和物	アスト ラゼネ カ	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気 腫)の諸症状の緩解	1回2吸入を1日2回吸入	1キット ¥4,150.30	院外	穂積
17	ハルロピテープ8mg 16mg 24mg 32mg 40mg	レボエンケタミン塩酸塩	久光	パーキンソン病	1日1回8mgから始め、以後経 過を観察しながら、必要に 応じて1週間以上の間隔で、1日量と して8mgずつ増量する。	8mg 1枚 ¥404.90 16mg 1枚 ¥623.00 24mg 1枚 801.50 32mg 1枚 958.40 40mg 1枚 1101.00	保留	横山
18	ラスビック錠75mg	ラスロキサシン塩酸 塩	杏林	咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃 周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、 慢性呼吸器病変の二次感染、中耳 炎、副鼻腔炎	1回75mgを1日1回経口投与す る。	1錠 ¥361.40	院外	峯田

- 1 アルケラン錠2mg：抗多発性骨髄腫剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 2 イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「サワイ」：脳循環障害後遺症改善薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 3 エフィエント錠3.75mg：抗血小板剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 4 ザファテック錠100mg：持続性選択的DPP-4阻害剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 5 セレネース細粒1%：抗精神病剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 6 ソフルーザ錠10mg：抗インフルエンザウイルス剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 7 ソフルーザ錠20mg：抗インフルエンザウイルス剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 8 ホリナート錠25mg「タイホウ」：制癌薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 9 マイスタン細粒1%：抗てんかん剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 10 ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」：A-IIアンタゴニスト（院内使用量減少→院外専用へ）

## 外用

- 1 プロメライン軟膏5万単位/g：壊死組織除去剤（院内使用量減少→院外専用へ）
- 2 バストロン点眼用0.5%：セフェム系抗生物質製剤（院内使用量減少→院外専用へ）

## 注射

- 1 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン：インスリン製剤（院内使用量減少→院外専用へ）

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。  
※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

（※別紙参照）

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社	薬価	薬効
1	アボルブカプセル0.5mg	GSK	¥214.0	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	第一三共 エスファ	¥59.3	前立腺肥大 症治療薬
2	エディロールカプセル0.5μg	中外=大正 製薬	¥69.2	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	沢井	¥24.9	活性型ビタ ミンD3製 剤
3	エディロールカプセル0.75μg	中外=大正 製薬	¥98.2	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	沢井	¥35.3	活性型ビタ ミンD3製 剤
4	ザイザル錠5mg	GSK	¥82.5	*レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	武田テバ ファーマ	¥33.0	アレルギー 性疾患治療 剤
5	ステーブラOD錠0.1mg	小野	¥90.3	*イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	杏林	¥34.8	過活動膀胱 治療剤
6	ゼチーア錠10mg	MSD= バイエル	¥173.2	*エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共 エスファ	¥63.1	高脂血症治 療剤
7	セレコックス錠100mg	アステラ ス	¥69.0	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ =日本薬 工	¥19.6	COX-2選 択的阻害剤
8	ベネット錠75mg	武田	¥2,317.3	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	東和薬品	¥646.6	骨粗鬆症治 療剤
9	ボノテオ錠50mg	アステラ ス	¥2,604.0	ミノドロン酸錠50mg「三笠」	三笠	¥1,007.8	骨粗鬆症治 療剤
10	メトグルコ錠250mg	大日本住 友	¥10.1	*メトホルミン塩酸塩錠250mgMT 「DSPB」	大日本住 友	¥10.1	ピグアナ イド系経口 血糖降下 剤
11	メモリーOD錠20mg	第一三共	¥429.5	*メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共 エスファ	¥163.6	アルツハイ マー型認知 症治療剤
12	レキップCR錠2mg	GSK	¥222.8	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」	沢井	¥88.0	徐放性ドパ ミンD2受 容体系作 動薬

\*AG製剤です

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。  
院外処方先発薬品の選択は可能です。

## 1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可)

- |                                               |   |                         |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------|
| 1) オキシコドン徐放錠「第一三共」<br>《販売中止になる予定のため》          | → | オキシコドン徐放錠NX「第一三共」       |
| 2) ケンエーG浣腸液50%<br>《経過措置期限切れのため(名称変更) 2021/4~》 | → | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」       |
| 3) 献血ヴェノグロブリンH5%静注5g/100r<br>《製造中止となる予定のため》   | → | 献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL |
| 4) ペルサンチン-Lカプセル150mg<br>《製造中止となる予定のため》        | → | ジピリダモール錠100mg「トーワ」      |
| 5) モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」<br>《製造中止となる予定のため》       | → | モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」    |

## 2. その他

- 1) カリクレイン錠10単位は製造中止のためカリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」に切り替えました。(院外のみ)
- 2) デキササルチン口腔用軟膏1mg/gはデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」に名称変更されました。
- 3) バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」はバルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」に名称変更されました。
- 4) 2%プロポフォール注「マルイシ」はプロポフォール静注2%50mL「マルイシ」に名称変更されました。
- 5) フェンタニル注射液「ヤンセン」はフェンタニル注射液「テルモ」に名称変更されました。
- 6) 院外処方箋への検査データの印刷について  
当委員会では印刷していくことが了承され、富士通に費用面を確認後、情報システム委員会に諮問することになった。