

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ダフクリア錠200mg (住友ファーマ)	フィダキソマイシン (FDX)	感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む)	通常、成人にはフィダキソマイシンとして1回200mgを1日2回経口投与する。	200mg ¥4012.8	院内 (用時購入)	藤田 (内科)
2	バイフォータス筋注シリンジ50mg・100mg (アストラゼネカ)	ニルセビマブ	1.生後初回又は2回目のRSウイルス感染流行期の重篤なRSウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児及び幼児における、RSウイルス感染による下気道疾患の発症抑制 2.生後初回のRSウイルス感染流行期の1.以外のすべての新生児及び乳児におけるRSウイルス感染による下気道疾患の予防	生後初回のRSウイルス感染流行期には、通常、体重5kg未満の新生児及び乳児は50mg、体重5kg以上の新生児及び乳児は100mgを1回、筋肉内注射する。 生後2回目のRSウイルス感染流行期には、通常、200mgを1回、筋肉内注射する。	50mgシリンジ ¥459,147 100mgシリンジ ¥906,302	院内 (用時購入)	深澤 (小児科)

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ツイミーグ錠500mg (住友ファーマ)	イメグリミン	2型糖尿病	通常、成人にはイメグリミン塩酸塩として1回1000mgを1日2回朝、夕に経口投与する。	500mg ¥34.1	院内 院外	内藤 (内科)
2	サルプレップ配合内用液 (富士薬品工業)	無水硫酸Na 硫酸K 硫酸Mg水和物	大腸内視鏡検査時の前処置における腸管内容物の排除	<p><検査当日に投与する場合>通常、成人には本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを投与した後、水又はお茶約1Lを1時間かけて飲む。以降、排泄液が透明になるまで本剤240mLあたり15分かけて投与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲むが、本剤の投与量は合計960mLまでとする。</p> <p><検査前日と当日に分けて2回投与する場合>通常、成人には検査前日に、本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを投与した後、水又はお茶約1Lを1時間かけて飲む。検査当日は、検査開始予定時間の約2時間以上前から、排泄液が透明になるまで本剤240mLあたり15分かけて投与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲むが、本剤の投与量は前日から合計960mLまでとする。</p>	480mL ¥959	院内	藤田 (内科)
3	ベオーバ錠50mg (杏林)	ビベグロン	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	通常、成人にはビベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。	50mg ¥152.7	院内 院外	吉村 (泌尿器科)
4	アルドネパッチ 27.5mg・55mg (興和)	ドネペジル	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	通常、軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、1日1回27.5mgを貼付する。高度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量する。なお、症状により1日1回27.5mgに減量できる。本剤は背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。	27.5mg/枚 ¥286.4 55mg/枚 ¥437.6	院外	山崎 (脳外科)
5	トリンテリック錠 10mg・20mg (武田)	ボルチオキセチン	うつ病・うつ状態	通常、成人にはボルチオキセチンとして10mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により1日20mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと。	10mg ¥161.7 20mg ¥242.5	院外	綱分 (家庭医療科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アブレース細粒20% (院外専用)	胃炎・胃潰瘍治療剤	製造販売中止 アブレース細粒あり
2	内用	アヘンチンキ「第一三共」	アヘンチンキ製剤	製造販売中止
3	内用	コランチル配合顆粒 (院外専用)	胃炎・消化性潰瘍用剤	製造中止 アブレースCapあり
4	内用	タペンタ錠25mg・50mg・100mg (院外専用品)	持続性がん疼痛治療剤	製造販売中止
5	内用	デトルシロールカプセル2mg (院外専用)	過活動膀胱治療剤	製造販売中止 使用ゼロ
6	内用	ベタニス錠25mg	選択的β3受容体作動性過活動膀胱	ベオーバ錠50mgと 入れ替えを検討
7	内用	ユニフィル錠200mg・400mg (院外専用)	気管支拡張剤・テオフィリン徐放錠	製造販売中止 テオフィリンあり
8	注射	アデラビン9号注2mL	肝臓抽出製剤	製造販売中止 代替薬なし
9	注射	水溶性ヒドロコトロン注射液100mg	副腎皮質ホルモン製剤・ ヒドロコルチゾン	使用量少ない リコステール100mgあり
10	注射	スルピリン注射液250mg「日医工」	ピリン系解熱剤	製造販売中止 代替薬なし
11	注射	ラシックス注100mg	ループ系利尿剤	20mgあり、使用量 減少
12	外用	タチオン点眼液2% (院外専用)	グルタチオン製剤	製造販売中止

切替えによる削除薬剤 (薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。)

No.	区分	薬品名
1	内用	D-ソルビトール内用液65%「マルイ」
2	内用	カナグル錠100mg (院外専用)
3	内用	ベシケアOD錠5mg
4	内用	ミルラクト細粒50% (院外専用)
5	内用	レルパックス錠20mg (院外専用)
6	外用	シムビコートタービュヘラー60吸入
7	外用	タプロス点眼点眼液0.0015%
8	外用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%
9	外用	ユーパスタコーワ軟膏 (院外専用) 興和
10	外用	リドカインテープ18mg「ニプロ」
11	注射	アネキセート注射液0.5mg
12	注射	ブリディオオン注200mg

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	バシケアOD錠5mg	アテラス	¥94.6	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	日医工	¥37.3	頻尿・尿失禁治療薬
2	レルパックス錠20mg(院外専用)	ガイアリス	¥411.6	エレクトリプタン錠20mg「DSEP」(院外専用)	第一三共エスファ	¥132.8	5HT1受容体作動薬片頭痛
3	タプロス点眼点眼液0.0015%	参天	¥1,497.5	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	日東メディック	¥770.0	緑内障治療薬
4	シムピコートタービュラ60吸入	アストラゼネカ	¥2,859.6	ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」	ヴィアトリス	¥1,364.6	ドライパウダー式喘息治療吸入剤
5	アネキセート注射液0.5mg	サンドファーマ	¥2,021.0	フルマゼニル注射液0.5mg「SW」	沢井	¥1,005.0	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
6	プリディオ注200mg	MSD	¥9,000.0	スガマデクス注シリンジ「マルイ」	丸石	¥3,003.0	筋弛緩回復剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	D-ソルビトール内用液65%「マルイ」	⇒	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	製造販売中止
2)	カナグル錠100mg (院外専用)	⇒	カナグルOD錠100mg (院外専用)	OD錠切り替え
3)	ミルラクト細粒50% (院外専用)	⇒	ガラントーゼ散50% (院外専用)	製造販売中止
4)	アドエア250・500ディスクス	⇒	レルベア100・200エリプタ30吸入	使用量減少 代替え検討
5)	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	⇒	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	使用量減少 代替え検討
6)	ユーパスタコーワ軟膏 (院外専用) 興和	⇒	ユーパスタ軟膏 (院外専用) ティカ製薬	製造販売移管
7)	リドカインテープ18mg「NP」	⇒	リドカインテープ18mg「NP」	限定出荷あり 切り替え

2. その他

- ディプリバン注1%200mg/20mLの規格追加 (麻酔科限定)
- 次回の薬事委員会は、11月 13日 (水) 16時から開催予定