

No.	薬品名	成分	会社	効能	用法	薬価	院内 院外 (用時)	申請者
1	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	デグレク・リ グド配合剤	ノボ	インスリンが適応となる 2型糖尿病	初期は1日1回10ドーズ	1キット ¥5,359	院内 院外 (用時)	榛葉
2	デザレックス錠5mg	デスロキサソ	杏林	アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・ 皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒	1回5mgを1日1回	1錠 ¥62.40	院外	榛葉
3	アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	ファイ ザー	嫌気性菌感染症、感染性腸炎 アメーバ赤痢	1回500mgを1日3回、20分以上 かけて点滴静注	1瓶 ¥1,275	院内 (用時)	藤田
4	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	メチコニド	田辺三 菱	尋常性乾癬、関節症性乾癬 クローン病	12週間隔で90mgを皮下投与	1筒 ¥445,131	院内	藤田
5	ケタスカプセル10mg	イブシラスト	杏林	1.気管支喘息 2.脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害によるめま いの改善	1.1回10mgを1日2回 2.1回10mgを1日3回	1C ¥20.40	院内 院外	永尾
6	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトリンエキ ソトメタノール酢酸	日本 ベーリ ンガー	非弁膜性心房細動患者における虚血性脳卒中 及び全身性血栓症の発症抑制	1回150mgを1日2回	1C ¥138.90	院内 院外	永尾
7	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロ トロン複合体	CSL ベーリ ング	ビタミンK拮抗薬投与中の患者における、急性重 篤出血時、又は重大な出血が予想される緊急を 要する手術・処置の施行時の出血傾向の抑制	PT-INR値と体重により投与量決 定。単回投与	1瓶 ¥35652.00	院内	永尾
8	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明 治」	ポピドンヨード	Meiji Seika	1.手指・皮膚の消毒 2.手術部位（手術野）の皮膚の諸毒	少量の水を加えて摩擦し、よく泡 立たせた後、 1.流水で洗う 2.滅菌ガーゼで拭うまたは、原液 塗布する	10mL ¥20.50	院内	永尾
9	タリージェ錠5mg 15mg	ミカバリン酸 塩錠	第一三 共	末梢性神経障害性疼痛	初期用量1回5mgを1日2回経口投 与し、その後1回用量として5mg ずつ1週間以上の間隔をあけて漸増 し、1回15mgを1日2回経口投与	5mg 1錠 ¥109.70 15mg 1錠 182.90	院外	大橋
10	テリボン皮下注28.2µgオートイン ジェクター	テリパチド酢酸 塩	旭化成 ファーマ	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	1日1回、週に2回皮下注射、投与 は24ヵ月間まで	1キット ¥6,018	院内 院外 (用時)	大橋
11	トルツ皮下注80mgオートインジェク ター	トラスメタム	リリー	既存治療で効果不十分な下記疾患 1.尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬 性紅皮症 2.強直性脊椎炎	1.初回に160mgを皮下投与し、2 週後から12週後までは1回80mg を2週間隔で皮下投与し、以降は1 回80mgを4週間隔で皮下投与す る。 2.1回80mgを4週間隔で皮下投与 する。	1キット ¥148,952	院外	大橋
12	アミティーザカプセル12µg	ルビプロスタ	マイラ ン EPD	慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	1回24µgを1日2回、朝食後及び 夕食後に経口投与する	1C ¥61.00	院内 院外	小泉
13	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールナ トリウム水和物	第一三 共	胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量ア スピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰 瘍の再発抑制 ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	1回20mgを1日1回経口投与する 非びらん性胃食道逆流症には1回 10mgを1日1回経口投与する	1包 ¥136.90	院内 院外 (用時)	小泉
14	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養 不活化狂犬病ウ ルタン	GSK	狂犬病の予防及び発病阻止	1.曝露前免疫 適切な間隔をおいて3回筋肉内に接 種する。 2.曝露後免疫 適切な間隔をおいて4～6回筋肉内 に接種する。	1瓶(溶解液付) ¥12,087	院内	松下
15	シングリックス筋注用	乾燥組織培養帯 状疱疹ワクチン	GSK	带状疱疹の予防	標準として1回目の接種から2ヵ月 後に2回目の接種を行う。	1瓶(溶解液付) ¥16,500	院内	松下
16	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデロニド・グリ ピドニウム臭化 物・ホルモナルマ ル酸塩水和物	アスト ラゼネ カ	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の 諸症状の緩解	1回2吸入を1日2回吸入	1キット ¥4,150.30	院外	穂積
17	ハルロピテープ8mg 16mg 24mg 32mg 40mg	レボドパミン塩酸塩	久光	パーキンソン病	1日1回8mgから始め、以後経過を 観察しながら、必要に応じて1週間 以上の間隔で、1日量として8mg ずつ増量する。	8mg 1枚 ¥404.90 16mg 1枚 ¥623.00 24mg 1枚 801.50 32mg 1枚 958.40 40mg 1枚 1101.00	院外	横山
18	ラスビック錠75mg	ラクソナリウム塩酸 塩	杏林	咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲 膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸 器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎	1回75mgを1日1回経口投与す る。	1錠 ¥361.40	院外	峯田

No.	薬品名	成分	会社	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	アサコール錠400mg	メフラゾ	ゼリア	潰瘍性大腸炎治療剤	2400mg 分3	1錠 ¥66.30	院内 院外	藤田
2	ツムラ(16)半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯I粒	ツムラ	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う諸症	7.5g 分3 毎食前	1g ¥9.60	院内 院外	小川
3	ネイリンカプセル100mg	ホスファコザール L-リソシタノール付 加物	佐藤製 薬	爪白癬	1日1回100mgを12週間 投与	1C ¥818.50	院外	飯田
4	ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg	ソマトロピ	ノボ	遺伝子組換え ヒト成長ホルモン	通常1週間に体重kg当 たり、ソマトロピン(遺 伝子組換え)として 0.175mgを6~7回に分 けて皮下に注射する	1キット ¥831366.0 0	院内 院外 (用時)	深澤
5	ヒルドイドフォーム0.3%	ハリリ類似物質	マルホ	血行促進、皮膚保湿剤	通常、1日1~数回適量を 塗布する	1g ¥22.10	院外	深澤
6	ピソノテープ2mg	ピソノテープ	トーア エイ ヨー	頻脈性心房細動	1日1回4mg	1枚 ¥57.9	院内 院外	内藤
7	ロソーゼット配合錠HD	エビチミブ・ロハス チン	MSD	高コレステロール血症、 家族性高コレステロール血症	1日1回1錠	1錠 ¥177.10	院内 院外	内藤
8	スマイラフ錠50mg、100mg	ハフィチニブ 臭化 水素酸塩	アステ ラス	既存治療で効果不十分な関節リウマ チ	1日1回 150mg	50mg 1錠 ¥1,749.40 100mg 1錠 ¥3,396.10	院外	大橋
9	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラグノスゼリー	三和 化学	1.慢性便秘症、2.高アンモニア血症 に伴う症候の改善、3.産婦人科術後 の排ガス・排便の促進	1.1回24g 1日2回 2.1回12~24g1日3回 3.1回12~36g1日2回	1包 ¥44.50	院内 院外	高橋
10	ピートル顆粒分包250mg	スロホリン水酸化 鉄	キッセ イ	透析中の慢性腎臓病患者における高 リン血症の改善	1回250mg 1日3回食 直前	1包 ¥174.00	院外	高橋
11	バリトゲンHD	硫酸バリウム	伏見	造影剤	検査部位及び検査方法に 応じ、本剤の適量に適量 の水を加えて適当な濃度 とし、その適量を経口投 与又は注射する。	10g ¥14.50	院内	鈴木
12	オメプラゾール錠10mg「トワ」	オメプラゾール	東和薬 品	消化性潰瘍	1日1回10~20mg	1錠 ¥23.80	院内 院外	松下
13	ツムラ(2)葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒	葛根湯加川芎辛 夷I粒	ツムラ	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎	7.5g 分3 毎食前	1g ¥10.40	白羽 専用	井上
14	アスパラ-CA錠200mg	L-アスパラギン酸カル シウム水和物	ニプロ ES	骨代謝改善剤、カルシウム補給剤	6錠 分2~3	1錠 ¥5.70	白羽 専用	井上
15	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾニドフラン コルポニドエステル・ウメ クリンニウム臭化 物・ピラソロールト リフェニル酢酸塩	GSK	慢性閉塞性肺疾患の諸症状の緩解	1日1回100エリプタ吸入	1キット ¥8853.80	院内 院外	穂積
16	イノラス配合経腸用液 りんごフレーバー、ヨーグルトフレー バー	経腸成分栄養剤	大塚	手術後患者の栄養保持 特に長期にわたり、経口的食事摂取 が困難な場合の経管栄養補給	1日562.5~937.5mL (900~1,500kcal)を 経管又は経口投与	10mL ¥15.70	院内 院外 (用時)	峯田

内用

- 1 アブストラル舌下錠200 μ g：麻薬性鎮痛薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 2 アミティーザカプセル24 μ g：下剤（12 μ gに規格変更→院外専用へ）
- 3 沈降炭酸カルシウム（散）：制酸薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 4 リザベン細粒10%：アレルギー用薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 5 ミラペックスLA錠0.375mg：抗パーキンソン薬（院内使用量減少→院外専用へ）

外用

- 1 アドエア500ディスクス60吸入用：気管支喘息用薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 2 アンペック坐剤20mg：麻薬性鎮痛薬（院内使用量減少→院外専用へ）
- 3 オキサロール軟膏25 μ g/g：皮膚軟化剤(ビタミンD剤)（院内使用量減少→院外専用へ）
- 4 オルセノン軟膏0.25%：外皮用薬（院内使用量減少→院外専用へ）

注射

- 1 シオゾール注10mg：抗リウマチ薬（院内使用量減少）

※後発品に変更により以下の薬剤は削除になります

内用

- 1 イメンドカプセル80mg
- 2 イメンドカプセルセット
- 3 デルモベート軟膏0.05%
- 4 メチロン注25%
- 5 ホスレノールOD錠500mg
- 6 ファムビル錠250mg

注射

- 1 フォルテオ皮下注キット600 μ g

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社	薬価	薬効
1	イメンドカプセル80mg	小野	¥3,408.90	アプレピタントカプセル80mg「NK」	日本化薬	¥1,381.00	制吐剤
2	イメンドカプセルセット	小野	¥11,816.50	アプレピタントカプセルセット「NK」	日本化薬	¥4,787.10	制吐剤
3	デルモベート軟膏0.05%	GSK	¥23.60	カハタリール® 0.05% 硝酸エステル軟膏0.05%「タイ-」	武田薬	¥9.10	外用用非ステロイド剤
4	メチロン注25%	第一三共	¥94.00	スルピリン注射液250mg「日医工」	日医工	¥94.00	鎮痛解熱薬
5	ホスレノールOD錠500mg	バイエル	¥228.90	炭酸ランタンOD錠500mg「フリ-」	扶桑	¥98.30	高リン血症治療剤
6	フォルテオ皮下注キット600µg	リリー	¥44,136.00	テリパラチドBS皮下注キット600µg「モダ」	持田	¥26,491.00	骨粗鬆症治療剤
7	ファミビル錠250mg	旭化成ファーマ	¥380.70	ファミシクロビル錠250mg「ト-ワ」	東和薬品	¥150.40	抗ウイルス化学療法剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方先発薬品の選択は可能です。

1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可)

- | | | |
|--|---|---|
| 1) アピスタンディン注射用20 μ g
《販売中止になるため》 | → | アルプ [®] 0529 [®] ルアルファ [®] ク注射用20 μ g「F」 |
| 2) 生理食塩液「比加」100mL
《納入価が安価になるため》 | → | 大塚生食注100mL |
| 3) サムスカ錠7.5mg・15mg
《OD錠へ切替え。但し15mgは院外のみ》 | → | サムスカOD錠7.5mg・15mg |
| 4) トラネキサム酸カプセル250mg「ト-7」
《原料入手困難のため出荷が一時停止するため》 | → | トランサミンカプセル250mg |
| 5) ミノサイクリン塩酸塩点滴用100mg「タ仔」
《供給不安定のため》 | → | ミノサイクリン塩酸塩点滴用100mg「日医工」 |

2. その他

- 1) エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」を規格追加しました。
- 2) コカール錠200mgはアセトアミノフェン錠200mg「三和」に名称変更されました。
- 3) チエナム点滴静注用キット0.5gは使用量減少のため用時購入となりました。
- 4) 4月よりセレネース注5mg、ホリゾン注射液10mg、ミタゾラム注射液10mgは施錠管理となります。
- 5) 新型コロナウイルスに伴う電話再診については受け入れる方向とする。