

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ウブトラビ錠 0.2mg 0.4mg (日本新薬)	セレキシパグ	肺動脈性肺高血圧症 外科的治療不応症又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症	通常、成人にはセレキシパグとして1回0.2mgを1日2回食後経口投与から開始する。忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で1回量として0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定する。なお、最高用量は1回1.6mgとし、いずれの用量においても、1日2回食後に経口投与する。	0.2mg ¥1,430.70 0.4mg ¥2,857.90	院内 院外 (用事 購入)	大橋 (内科)
2	サフネロー点滴静注300mg (アストラゼネカ)	アニフロルマブ(遺伝子組換え)、	既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス	通常、成人にはアニフロルマブ(遺伝子組換え)として、300mgを4週間ごとに30分以上かけて点滴静注する。	300mg/2mL 薬価未収載	院内 (用事 購入)	大橋 (内科)
3	アイファガン点眼液0.1% (千寿)	プリモニジン 酒石酸塩	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合、緑内障、高眼圧症	通常、1回1滴、1日2回点眼	0.1%1mL ¥453.20	院内 院外	磯貝 (眼科)
4	グラナテック点眼液0.4% (興和)	リバスジル塩 酸塩水和物 液	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合、緑内障、高眼圧症	通常、1回1滴、1日2回点眼	0.4%1mL ¥453.00	院内 院外	磯貝 (眼科)
5	ベタニス錠25mg (アステラス)	ミラベグロン	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	通常、成人にはミラベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。	25mg ¥101.5	院内 院外	渡邊 (泌尿器 科)
6	エナジア吸入用カプセル 中用量 高用量 (ノバルティス)	インダカテ ロール酢酸 塩 グリコピロニウ ム臭化物 及びモメタゾ ンフランカル ボン酸エステ ル	気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β2刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合)	通常、成人にはエナジア吸入用カプセル中用量1回1カプセルを1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。なお、症状に応じてエナジア吸入用カプセル高用量1回1カプセルを1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。	中用量1cap ¥290.30 高用量1cap ¥331.50	院内 院外	穂積 (呼吸器 科)
7	テリルジー200エリプタ 30吸入用 (GSK)	フルチカゾン フランカルボ ン酸エステ ル・ウメクリジ ニウム臭化 物・ピランテ ロールトリフェ ニル酢酸塩 吸入剤	気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)	<気管支喘息> 通常、成人にはテリルジー100エリプタ1吸入を1日1回吸入投与する。なお、症状に応じてテリルジー200エリプタ1吸入を1日1回吸入投与する。 <慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解> 通常、成人にはテリルジー100エリプタ1吸入を1日1回吸入投与する。	30吸入 1キット ¥10043.30	院外	穂積 (呼吸器 科)

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ピバンセカプセル 20mg 30mg(塩野義)	リスデキサン フェタミンメシ ル酸塩	小児期における注意欠陥/ 多動性障害(AD/HD)	通常、小児にはリスデキサンフェタミンメシル酸塩として30mgを1日1回朝経口投与する。症状により、1日70mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として20mgを超えない範囲で行うこと。	20mg1錠 ¥663.70 30mg1錠 ¥735.40	院内 院外(患者 限定)	深澤 (小児)
2	ムーベン配合内用液 (日本製薬=武田)	ナトリウム・ カリウム 配合剤液	大腸内視鏡検査及び大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除	本品1本(500mL)を水で4倍に希釈して全量約2Lの希釈液とする。通常、成人1回希釈液2~4Lを1時間あたり約1Lの速度で経口投与する。ただし、排泄液が透明になった時点で投与を終了し、4Lを超えての投与は行わない。	500mL/1瓶 ¥560.80	院内 院外	小泉 (外科)
3	ハラヴェン静注1mg (エーザイ)	エリブリン メシル酸塩 注射液	手術不能又は再発乳癌、悪性軟部腫瘍	通常、成人には、エリブリンメシル酸塩として、1日1回1.4mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を2~5分間かけて、週1回、静脈内投与する。これを2週連続で行い、3週目は休薬する。これを1サイクルとして、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	1mg/1瓶 ¥67,121	院内	小泉 (外科)
4	ジクトルテープ75mg (久光)	ジクロフェナク ナトリウム 貼付剤	各種がんにおける鎮痛	通常、成人に対し、1日1回、2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。なお、症状や状態により1日3枚(ジクロフェナクナトリウムとして225mg)に増量できる。	1枚 ¥156.50	院内 院外	大石 (外科)
5	エンレスト錠 100mg (ノバルティス)	サクビトリル バルサルタン ナトリウム 水和物錠	慢性心不全ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。	100mg ¥115.20	院内 院外	内藤 (内科)
6	エンレスト錠 200mg (ノバルティス)	サクビトリル バルサルタン ナトリウム 水和物錠	慢性心不全ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。	200mg ¥201.90	院外	内藤 (内科)
7	ユリス錠 1mg (富士薬品=持田)	ドチヌラド	痛風、高尿酸血症	通常、成人にはドチヌラドとして1日0.5mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回2mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回4mgとする。	1mg ¥54.80	院内 院外	内藤 (内科)
8	ユリス錠 2mg (富士薬品=持田)	ドチヌラド	痛風、高尿酸血症	通常、成人にはドチヌラドとして1日0.5mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回2mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回4mgとする。	2mg ¥100.20	院外	内藤 (内科)
9	リベルサス錠 3mg 7mg (ノボ=MSD)	セマグルチド (遺伝子組換 え)錠	2型糖尿病	通常、成人には、セマグルチド(遺伝子組換え)として1日1回7mgを維持用量とし経口投与する。ただし、1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる。	3mg ¥143.20 7mg ¥334.20	院内 院外	内藤 (内科)
10	リベルサス錠 14mg (ノボ=MSD)	セマグルチド (遺伝子組換 え)錠	2型糖尿病	通常、成人には、セマグルチド(遺伝子組換え)として1日1回7mgを維持用量とし経口投与する。ただし、1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる。	14mg ¥501.30	院外	内藤 (内科)
11	エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター (リリー=第一三共)	ガルカネズマ ブ(遺伝子組 換え)	片頭痛発作の発症抑制	通常、成人にはガルカネズマブ(遺伝子組換え)として初回に240mgを皮下投与し、以降は1カ月間隔で120mgを皮下投与する。	120mg1mL1 キット ¥45,165.00	院内	永尾 (脳外科)
12	ドボベツフォーム (レオファーマ=協和キリン)	カルシポトール水和物ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬	通常、1日1回、患部に適量塗布する。	1g ¥221.30	院外	飯田 (皮膚科)
13	メノエイドコンピパッチ (久光)	エストラジ オール・酢酸 ノルエチステ ロン貼付剤	更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経系症状(Hot flush及び発汗)	通常、成人に対し、メノエイドコンピパッチ1枚を3~4日ごとに1回(週2回)下腹部に貼付する	1枚¥ 385.10	院外	松本 (産婦人科)
14	ミレーナ52mg (パイエル)	レボノルゲスト レルキット	避妊、過多月経、月経困難症	本剤1個を子宮腔内に装着する。	52mg/1個 ¥26,956	院内 (用事 購入)	松本 (産婦人科)
15	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (ノバルティス)	プリンゾラミ ド・チモロール マレイン酸塩 液	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日2回点眼する	1mL ¥360.40	院外	清水 (眼科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセトアミノフェン中毒解毒剤	
2	内用	アラバ錠10mg	抗リウマチ剤	
3	内用	アラバ錠20mg	抗リウマチ剤	
4	内用	イトラコナゾールCap50mg「サワイ」	抗真菌剤	
5	内用	クロミッド錠50mg	排卵誘発剤	
6	内用	スンベプラCap100mg	抗ウイルス剤	
7	内用	ダクルインザ錠60mg	抗ウイルス剤	
8	内用	沈降炭酸カルシウム(散剤)	制酸剤	
9	内用	ヒダントールF配合錠	抗てんかん剤	
10	内用	ペルマックス錠250μg	パーキンソン病治療剤	
11	内用	マグコロールP50g	経口腸管洗浄薬	
12	内用	ユリノーム錠25mg	尿酸排泄剤	
13	外用	イムノブラダー膀胱用80mg	抗悪性腫瘍剤	
14	外用	ペントサ注腸1g:潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療剤	
15	外用	アクリノール消毒液0.1%「東豊」	消毒液	製造中止
16	注射	アロキシ静注0.75mg(100μL)	5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗型制吐剤	バック製剤あり
17	注射	エルシトニン注40単位	合成カルシトニン誘導体制剤	
18	注射	ギャバロン髄注0.005%1mL	抗痙縮剤	
19	注射	ギャバロン髄注0.2%5mL:抗痙縮剤	抗痙縮剤	
20	注射	ジェノトロピンゴキック注用12mg	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤	
21	注射	トブラシン注60mg	アミノグリコシド系抗生物質	
22	注射	パパペリン塩酸塩注40mg	血管拡張・鎮痙剤	

切替えによる削除薬剤(別紙(4)(5)薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。)

No.	区分	薬品名
1	内用	アモキシシリンカプセル「武田化」
2	内用	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」
3	内用	セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」
4	外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」
5	外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」
6	注射	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」
7	注射	パーサビブ静注透析用2.5mg/瓶(シリンジ製剤に切替)
8	注射	パーサビブ静注透析用5mg/瓶(シリンジ製剤に切替)

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。  
 ※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価3	薬効
1	今回はありません			今回はありません			

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。  
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

## 1. 切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	アモキシシリンカプセル250mg「武田パ」	⇒	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	販売中止のため
2)	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザ」	⇒	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「YD」	販売中止のため
3)	セフカペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「ファイザ」	⇒	セフカペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	販売中止のため
4)	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザ」	⇒	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	販売中止のため
5)	パーサビブ静注透析用2.5mg/瓶	⇒	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	シリンジ製剤に切り替え
6)	パーサビブ静注透析用5mg/瓶	⇒	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	シリンジ製剤に切り替え
7)	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザ」	⇒	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	販売中止のため
8)	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザ」	⇒	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」	販売中止のため
9)	ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」	⇒	ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」	販売中止のため(院外のみ)

## 2. その他