別紙（1）

臨床使用申請薬剤

令和5年　11月　8日
第58回　薬事委員会

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ラスビック点滴静注キット150㎎（杏林製薬）	ラスクフロキサシン塩酸塩	肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染	通常、成人にはラスクフロキサシンとして、投与初日に300mgを、投与2日目以降は150mgを1日1回点滴静注する。	150㎎ ￥3,999	院内	内藤 (内科)
2	モノヴァー静注 500㎎・1000㎎ （日本新薬）	デルイソマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血	通常、体重50kg以上の成人には、鉄として1回あたり1000mgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。通常、体重50kg未満の成人には、鉄として1回あたり20mg/kgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。	500mg ￥6,189 1000mg ￥12,377	院内	大石 (外科)
3	アジマイシン点眼液1% （千寿）	アジスロマイシン	結膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎	＜結膜炎＞ 通常、成人及び7歳以上の小児には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回5日間点眼する。 ＜眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎＞ 通常、成人には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回12日間点眼する。	2.5mL 1瓶￥735.5	院外	松岡 (眼科)
4	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL （陽進堂）	パルナパリンナトリウムキット	血液体外循環時の灌流血液の凝固防止 （血液透析・血液透析ろ過・血液ろ過）	○出血性病変又は出血傾向を有しない患者の場合 ・通常、成人には体外循環開始時、パルナパリンナトリウムとして治療1時間あたり7～13単位/kgを体外循環路内血液に単回投与する。なお、体外循環路内の血液凝固状況に応じ適宜増減する。 ・通常、成人には体外循環開始時、パルナパリンナトリウムとして15～20単位/kgを体外循環路内血液に単回投与し、体外循環開始後は毎時6～8単位/kgを抗凝固薬注入ラインより持続注入する。なお、体外循環路内の血液凝固状況に応じ適宜増減する。 ○出血性病変又は出血傾向を有する患者の場合 通常、成人には体外循環開始時、パルナパリンナトリウムとして10～15単位/kgを体外循環路内血液に単回投与し、体外循環開始後は毎時6～9単位/kgを抗凝固薬注入ラインより持続注入する。	20mL/1筒 ￥455	院内	尾崎 (臨床工学科)

処方オーダー入力は11/15(水)から可能です。

別紙（2）

新規採用薬剤

令和5年　11月　8日
第58回　薬事委員会

No.	薬品名（会社）	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	ベージニオ錠 50㎎・100㎎・150㎎ （日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ）	アベマシクリブ	ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	内分泌療法剤との併用において、通常、成人にはアベマシクリブとして1回150mgを1日2回経口投与する。ただし、術後薬物療法の場合には、投与期間は24ヵ月間までとする。なお、患者の状態により適宜減量する。	50㎎ ￥3319 100㎎ ￥6059.4 150㎎ ￥8616.8	院内 院外	大石康 (外科)
2	ブコラムロ腔用液 2.5㎎・5㎎・7.5㎎ （武田薬品）	ミダゾラム	てんかん重積状態	通常、修正在胎52週（在胎週数＋出生後週数）以上1歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回2.5mg、1歳以上5歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回5mg、5歳以上10歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回7.5mg、10歳以上18歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回10mgを頬粘膜投与する。	2.5mg0.5mL1筒 ￥1,125.80 5㎎1mL1筒 ￥1,977.80 7.5mg1.5mL1筒 ￥2,750.00	院内	深澤 （小児科）
3	モイゼルト軟膏 0.3%・1% （大塚製薬）	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎	通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。 通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる	0.3%1g ￥142.00 1%1ｇ ￥152.10	院外	深澤 （小児科）
4	マンジャロ皮下注 2.5㎎・5㎎アテオス （田辺三菱製薬）	チルゼパチド	2型糖尿病	通常、成人には、チルゼパチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。 なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。	2.5mg0.5mL1kit ￥1,924 5mg0.5mL1kit ￥3,848	院内 院外	内藤 (内科)
5	スキリージ皮下注 150㎎シリンジ1mL （アッヴィ）	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、掌蹠膿疱症	＜尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症＞ 　通常、成人にはリサンキズマブ（遺伝子組換え）として、1回150mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態に応じて1回75mgを投与することができる。 ＜掌蹠膿疱症＞ 　通常、成人にはリサンキズマブ（遺伝子組換え）として、1回150mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与する。	150mg1mL1筒 ￥474,616	院内	近藤 (内科)
6	ダーブロック錠 ２㎎・４㎎ （協和キリン）	ダプロデュスタット	腎性貧血	通常、成人にはダプロデュスタットとして1回2mg又は4mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回24mgまでとする。	2㎎　￥172.2 4㎎　￥303.6	院内 院外	大橋 (内科)
7	ナノゾラ皮下注30㎎ シリンジ （大塚製薬）	オゾラリズマブ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	通常、成人にはオゾラリズマブ（遺伝子組換え）として1回30mgを4週間の間隔で皮下投与する。	30mg0.375mL1筒 ￥112,476	院内 院外	大橋 (内科)
8	エクフィナ錠 ５０㎎ （エーザイ）	サフィナミドメシル酸塩	レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing off現象の改善	本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。通常、成人にはサフィナミドとして50mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じて100mgを1日1回経口投与できる。	50㎎　￥886.7	院外	門脇 (脳外科)

別紙（3）

削除決定薬剤

令和5年　11月　8日
第58回　薬事委員会

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	フェルムカプセル100mg(院外専用)	徐放性鉄剤	製造販売中止
2	内用	フルカムカプセル27mg(院外専用)	鎮痛・抗炎症剤	製造販売中止
3	内用	レミッチカプセル2.5μg(院外専用)	経口そう痒症改善剤	製造販売中止、同OD錠採用あり
4	外用	トパルジック軟膏1％(院外専用)	非ステロイド系　消炎・鎮痛外用剤	製造中止・使用減少
5	注射	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μｇ「F	プロスタグランジンE1製剤	製造中止・使用減少

切替えによる削除薬剤（薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
1	内用	エソメプラゾールCap10㎎「ケミファ」
2	内用	カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」
3	内用	パンテチン散20%「テバ」
4	内用	ボセンタン錠62.5㎎「モチダ」
5	外用	ネリプロクト軟膏2ｇ・10ｇ(院外専用)
6	注射	カピステン筋注50㎎
7	注射	ニコランジル注12㎎「日医工」
8	注射	フロセミド20㎎注「日医工」

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて
市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

別紙（4）

後発品変更薬剤

令和5年　11月　8日
第58回　薬事委員会

№.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	カピステン筋注50mg	キッセイ	¥114.0	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	日新	¥57.0	鎮痛･消炎･解熱剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方は先発薬品の選択は可能です。

別紙（5）

薬事委員会からのお知らせ

令和5年　11月　8日
第58回　薬事委員会

１.切り替え薬品　（院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。）

No.	切替え前	⇨	切替え後	備考
1)	エソメプラゾールCap10㎎「ケミファ」	⇨	エソメプラゾールCap10㎎「トーワ」	
2)	カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」	⇨	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	製造販売継承
3)	パンテチン散20%「テバ」	⇨	パンテチン散20%「NIG」	製造販売継承
4)	ボセンタン錠62.5㎎「モチダ」	⇨	ボセンタン錠62.5㎎「サワイ」	製造販売中止
5)	ネリプロクト軟膏2ｇ/1本（院外専用）	⇨	ネリザ軟膏2ｇ/1本	製造販売中止
6)	ニコランジル注12㎎「日医工」	⇨	ニコランジル注12㎎「サワイ」	製造販売中止
7)	フロセミド20㎎注「日医工」	⇨	フロセミド20㎎注「NIG」	製造販売中止

２.その他

・　次回の薬事委員会は、2月　7日（水）16時から開催予定