

No.	薬品名 (会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	オニバイド点滴静注43mg (日本セルヴィエ)	イリノテカン塩酸塩水和物 リポソーム製剤	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵がん	フルオロウラシル及びレボホリナートとの併用において、通常、成人にはイリノテカンとして1回70mg/m ² (体表面積) を90分かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。	43mg/1瓶/ ¥114,410	院内 (用時)	山中 (内科)
2	アレジオン眼瞼クリーム0.5% (参天)	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性結膜炎	通常、適量を1日1回上下眼瞼に塗布する。	1g/¥1,686.70	院外	古森 (眼科)
3	エイベリス点眼液0.002% (参天)	オミデネパグイソプロピル	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼する	1mL/¥831.10	院外	古森 (眼科)
4	レクビオ皮下注300mgシリンジ (ノバルティス)	インクリシランナトリウム	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分、又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない	通常、成人にはインクリシランナトリウムとして1回300mgを初回、3ヵ月後に皮下投与し、以降6ヵ月に1回の間隔で皮下投与する。	1筒/ ¥443,548	院内 (用時)	坂本 (内科)

No.	薬品名(会社)	成分	効能	用法	薬価	院内 院外	申請者
1	オスタバロ皮下注カー トリッジ1.5mg (帝人ファーマ)	アバロパラチド	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	通常、成人には1日1回アバロパラチドとして80 μ gを皮下に注射する。 なお、本剤の投与は18ヵ月間までとすること。	1.5mg/0.75m ℓ ¥16,090	院内 院外 (用時 購入)	鈴木 (整形 外科)
2	フィコンパ点滴静注用 2mg (I-ザイ)	ペランパネル	一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対する経口製剤の代替療法 ○てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) ○他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法	○ペランパネルの経口投与から本剤に切り替える場合 ペランパネル経口投与と同じ1日用量を、1日1回30分以上かけて点滴静脈内投与する。ただし、4歳以上12歳未満の小児への投与時間は90分とする。 ○ペランパネルの経口投与に先立ち本剤を投与する場合 通常、成人及び4歳以上の小児にはペランパネルとして1日1回2mgの投与より開始し、その後2週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増し、維持用量は1日1回4~8mgとし、30分以上かけて点滴静脈内投与する。ただし、4歳以上12歳未満の小児への投与時間は90分とする。	2mg/1瓶 ¥1,962	院内 (用時 購入)	山崎 (脳外 科)
3	テゼスパイア皮下注 210mgペン(アストラゼネカ)	テゼペルマブ	気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)	通常、成人及び12歳以上の小児にはテゼペルマブ(遺伝子組換え)として1回210mgを4週間隔で皮下に注射する。	210mg/1キット ¥170,987	院内 院外 (用時 購入)	中井 (呼吸 器科)

No.	区分	薬品名	薬効分類	備考
1	内用	アスコルビン酸原末500g	ビタミンC剤	院内使用6か月ゼロ 使用量減少、リト ロン酸Na錠75mgあ り
2	内用	ミノドロン酸錠50mg「三笠」	骨粗鬆症治療剤	院内使用6か月ゼ ロ
3	内用	ポントールシロップ	解熱・鎮痛剤	使用量減少、ワル ブレップに切り替 え
4	内用	モビブレップ配合内用剤	経口腸管洗浄剤	院内の使用減、ホ トミツエクターあり
5	内用	キックリンカプセル	高リン血症治療剤（リン酸結合性 ポリマー）	使用量減症、フォ バル等代替薬あり
6	注射	テリボン皮下注用56.5 μ g	骨粗鬆症治療剤	院内の使用減、ホ トミツエクターあり
7	注射	ニコランジル点滴静注48mg	不安定狭心症・急性心不全治療剤	院内の使用減
8	注射	レパーサ皮下注420mgオートミニドザー	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗 体製剤	製造中止、同ペン 製剤あり

切替えによる削除薬剤（薬事委員会からの後発品変更薬剤及びお知らせを参照して下さい。）

No.	区分	薬品名
1	内用	ゼローダ錠300mg
2	内用	ジブレキサ錠5mg
3	内用	ベザトールSR錠200mg
4	外用	アラセナA軟膏5g
5	外用	ネリザ軟膏2g（院外専用）
6	注射	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ5mL
7	注射	ボンビバ静注1mgシリンジ1mL

※後発薬剤採用に伴う先発薬剤は院内在庫がなくなり次第、院内の入力は不可となります。

※経過措置期限切れとなる薬剤は期限日まで使用できますが製造中止となる薬剤も含めて市場での流通が困難となった場合や院内在庫終了時は入力不可となる場合があります。

No.	先発薬品名	会社	薬価	後発薬品名	会社2	薬価2	薬効
1	ジプレキサ錠5mg	イーライリリー	¥103.1	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	東和	¥18.9	抗精神病薬
2	ゼローダ錠300mg	チェプラファーム	¥135.1	カペシタビン錠300mg「サワイ」	沢井	¥60.8	抗悪性腫瘍剤
3	ベザトールSR錠200mg	キッセイ	¥15.2	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	東和	¥10.1	高脂血症治療剤
4	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ5mLルアーロック	大塚	¥849.0	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」スリップタイプ5mL	東和	¥384.0	レボカルニチン製剤
5	ボンピバ静注1mgシリンジ1mL	大正	¥3,476.0	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	プリオファーマ=ヴィアトリス	¥1,800.0	骨粗鬆症治療剤
6	アラセナA軟膏 5g	持田	¥732.5	ビダラビン軟膏3%「トーワ」5g	東和	¥385.5	抗ウイルス外用剤

先発薬品の院内在庫が終了次第後発薬品変更します。
院外処方では先発薬品の選択は可能です。

- 1 .切り替え薬品 (院内在庫終了次第切り替え、院外は切り替え後も使用可ですが製造販売中止予定の薬剤は市場での流通が困難となった場合は入力不可となる場合があります。)

No.	切替え前	⇒	切替え後	備考
1)	イミダプリル錠5mg「VTRS」	⇒	イミダプリル錠5mg「トーフ」	製造販売中止
2)	ハリゾンシロップ100mg/ml 24ml	⇒	ファンギゾンシロップ100mg/ml 24ml (先発品)	製造販売中止
3)	ネリザ軟膏2g (院外専用)	⇒	ヘモレックス軟膏2g (院外専用)	限定出荷あり 切り替え

2 .その他

- マンジャロ皮下注アテオス 7.5mg・10mg・12.5mg・15mg 規格追加 (院外のみ)
- 次回の薬事委員会は、5月に開催予定