

内視鏡 休薬期間 目安

2024.12.25

通常	生検	出血低危険度	出血 高危険度
内視鏡 ERCP		バルン内視鏡 マーキング (クリップ、高周波、点墨など) 消化管、膵管、胆管ステント 留置法(事前の切開手技を伴 わない) 内視鏡的乳頭バルン 拡張術	ポリベクトミー 内視鏡的粘膜切除術(EMR) 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 内視鏡的乳頭括約筋切除術(EST) 内視鏡的十二指腸乳頭切除術 内視鏡的粘膜焼灼術(APC)

薬効分類	一般名	商品名	1剤	2剤以上	1剤	2剤以上 (抗凝固薬+抗血小板薬)
------	-----	-----	----	------	----	----------------------

抗凝固薬

抗凝固剤 (ワーファリン)	ワルファリンカリウム	ワーファリン錠	休薬なし	休薬なし PTINR<3.0 を確認	症例に応じて 慎重に対 応する	休薬なし PTINR<3.0を確認	INRを治療域内の低値に保ち 継続(当日休薬可) or 非弁膜症性心房細動のとき、 INRが有効域を切っていること を確認してDOACに一時的に変 更も考慮	抗血小板薬は アスピリンorシロスタゾール 単独投与に変更 (当日休薬可) *シロスタゾール置換 アスピリンorシロスタゾールに変更は 3~5日前から チエノピリジン誘導体に変更は 5~7日前から ワーファリンは、 INRを治療域に保ち継続 or ヘパリン置換 or 非弁膜症性心房細動のとき、INR が有効域を切っていることを確認し てDOACに一時的に変更も考慮
------------------	------------	---------	------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--	---

抗凝固剤 (DOAC)	ダビガトランエトキシラート	プラザキサカプセル	休薬なし	服用から2 ~4時間以 降に内視鏡 処置 or 朝夕を処置 後に内服	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし 服用から2~4時間以降 に内視鏡処置 or 朝夕を処置後に内服	当日朝から中止 翌日朝から再開 (腎機能低下例で抗凝固効果 増強や中止後の遅延に注意)	抗血小板薬は アスピリンorシロスタゾール 単独投与に変更 (当日休薬可) DOACは: 当日朝から中止 翌日朝から再開 *シロスタゾール置換はワーファリンの項 参照
	リバーロキサパン	イグザレルト錠						
	アピキサパン	エリキュース錠						
	エドキサパン	リクシアナ錠						

抗血小板薬

血小板凝集抑制剤 (アスピリン 含有)	アスピリン	バイアスピリン錠	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	(血栓塞栓症の発症リスクが低 い場合は 3~5日休薬考慮)	アスピリンorシロスタゾール 単独投与に変更 (当日休薬可) チエノピリジン誘導体5~7日休薬 その他の抗血小板薬1日休薬 *シロスタゾール置換はワーファリンの項 参照
	アスピリン/ダイアルミネート	バファリン配合錠・アスファネート 配合錠・ニトギス配合錠・パッサ ミン配合錠・ファモター配合錠						
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ配合錠						
	アスピリン/ボノブラザン	キャブピリン配合錠						

血小板凝集抑制剤 (チエノピリジン 誘導体)	テクロピジン	パナルジン錠	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	5~7日休薬 (血栓塞栓症の発症リスクが高 い場合はアスピリンorシロスタ ゾールに置換)	アスピリンorシロスタゾール 単独投与に変更 (当日休薬可) チエノピリジン誘導体5~7日休薬 その他の抗血小板薬1日休薬 *シロスタゾール置換はワーファリンの項 参照
	クロピドグレル	プラビックス錠						
	プラスグレル	エフィエント錠						
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラピン配合錠 ロレアス配合錠						
血小板凝集抑制剤 (ヒリミジン群)	チカグレロル	ブリリント錠	本邦ガイドライン記載なし			欧州消化器内視鏡学会 3~5日前休薬 米国内視鏡学会 5日前休薬	本邦ガイドライン記載なし	

血小板凝集抑制剤 (シロスタゾール)	シロスタゾール	プレタール錠	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	休薬なし	シロスタゾール継続 併用薬は該当箇所参照
-----------------------	---------	--------	------	------	-----------------------	------	------	-------------------------

その他

血小板凝集抑制剤	イコサペント酸エチル	エパデール	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	1日休薬	1日休薬 併用薬は該当箇所参照
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ						
	サルボグレラート	アンブラグ錠						
血小板凝集抑制剤 (プロスタグランジン 製剤)	リマプロストアルファデクス	オパルモン錠	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	1日休薬	1日休薬 併用薬は該当箇所参照
	ペラプロストナトリウム	プロサイリン錠・ドルナー錠 ペラサスLA錠・ケアロードLA錠						

冠血管拡張薬	ジピリダモール	ペルサンチン錠	休薬なし	休薬なし	症例に応じ て慎重に対 応する	休薬なし	1日休薬	1日休薬 併用薬は該当箇所参照
	塩酸ジラゼブ	コメリアンコーワ錠						
	トラビジル	ロコルナール錠						
脳循環代謝改善	イブジラスト	ケタスカプセル	休薬なし	ガイドライン記載なし				
	ニセルゴリン	サアミオン錠						
	イフェンプロジル	セロクラール錠						

DM薬(内服・インスリン)

当日朝から検査終了まで中止

参考文献 抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン2012 日本消化器内視鏡学会
直接経口凝固薬(DOAC)を含めた抗凝固薬に関する追補2017 日本消化器内視鏡学会
添付文書・インタビューフォーム
手術医療の実践ガイドライン2013 日本手術医学会